

Hieronder vindt u een lijst met veel voorkomende kinderziektes op school. Als school hanteren wij de richtlijnen van de GGD. Op de site van de GGD vindt u nog meer [informatie over deze kinderziektes](#) en andere ziektes.

Als uw kind ziek is, vragen wij u dit altijd te melden aan de leerkracht. Als die ziekte (bij een aantal soorten) namelijk meer voorkomt binnen de groep en of school, zijn wij verplicht om dit te melden bij de GGD.

Ziekte	Ziekteverschijnselen	Incubatietijd	Besmettelijk?	Wering school *	Risicogroepen
Bof	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dikke wang en hals gedurende 7 tot 10 dagen</li> <li>- pijn in of achter het oor</li> <li>- droge mond</li> <li>- soms koorts</li> <li>- soms hoofdpijn</li> </ul>	5 Tot 14 dagen.	Ja, 5 dagen voor tot negen dagen na het begin van de zwelling.	Nee, maar meestal zijn de kinderen te ziek om naar school te gaan.	Zuigelingen, kinderen en volwassenen die niet gevaccineerd zijn.
Diarree (virus, bacterie, toxine, parasiet)	Meer dan 3x per dag dunne tot waterdunne ontlasting.	Uren tot enkele weken.	Ja, tot diarree over is (nee bij toxine).	<p>Nee (ja, bij bloederige diarree)</p> <p>Vaak willen de kinderen zelf thuis blijven omdat het ongemakkelijk is.</p>	Zuigelingen meer risico op uitdrogen.

Griep	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hoofdpijn</li> <li>- soms misselijkheid</li> <li>- hoge koorts</li> <li>- hoesten</li> <li>- spierpijn</li> </ul>	1 Tot 4 dagen.	Van 1 dag vóór tot 6 dagen na het begin van de ziekte - verschijnselen.	Nee	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zuigelingen</li> <li>- jonge kinderen met hart- en longaandoeningen (astma, cystic fibrosis)</li> </ul>
Kinkhoest	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In het begin een gewone verkoudheid.</li> <li>- Vervolgens hevige, plotseling opkomende hoestbuien gepaard gaand met een gierend geluid en het opgeven van taai slijm. Vaak 's nachts.</li> <li>- Hoestaanvallen, kunnen weken tot maanden doorgaan en putten het kind uit.</li> </ul>	7 Tot 21 dagen.	Ja, met name in de eerste fase van de ziekte, tot 4 weken na het begin van de hoestbuien. Zodra het kenmerkende hoesten begint, is de besmettelijkheid al veel minder. Na aanvang van behandeling met antibiotica is het kind na 5 dagen niet meer besmettelijk.	Nee	<ul style="list-style-type: none"> <li>- niet of onvolledig gevaccineerde zuigelingen</li> <li>- kinderen met harten longziekten</li> </ul>
Krentenbaard (impetigo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Begint meestal met blaasjes op neus of mond,</li> <li>- Blaasjes barsten open,</li> <li>- Honinggele korst,</li> <li>- Plekken breiden zich uit: "baard van krenten"</li> </ul>	2 Tot 10 dagen, meestal kort.	Ja, het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk zolang de blaasjes nog niet zijn ingedroogd. Na aanvang van behandeling met antibiotica is het kind na 48 uur niet meer besmettelijk.	Ja, de aandoening <u>moet</u> wel behandeld worden door de huisarts <ul style="list-style-type: none"> <li>- bij verminderde weerstand</li> <li>- bij virale luchtweginfecties</li> <li>- na waterpokken</li> <li>- zolang de blaasjes niet behandeld zijn en</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pasgeborenen</li> <li>- bij huidaandoeningen (eczeem, verwondingen)</li> </ul>

				of ingedroogd mogen de kinderen <u>niet</u> naar school komen vanwege de hygiëne en besmettelijkheid gevaar	
Mazelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hoge koorts:</li> <li>· neusverkouden</li> <li>· harde droge hoest</li> <li>· rode ogen (lichtschuw)</li> <li>- vervolgens zakt de koorts:</li> <li>rood omrande witte stippen aan de binnenkant van de wangen, rode vlekken achter oren, uitslag verspreidt zich over de rest van het lichaam</li> </ul>	8 Tot 14 dagen, meestal 10 dagen.	Ja, vanaf 1-2 dagen vóór het begin van de huiduitslag tot 4 dagen na het verschijnen van de uitslag.	Nee, maar meestal zijn de kinderen te ziek om naar school te gaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij zuigelingen kan mazelen een ernstig beeld geven met name als de moeder niet immuun is (nooit gevaccineerd).</li> <li>- Bij ongevaccineerde volwassenen treden vaker complicaties op.</li> </ul>
Rode hond	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kind is nauwelijks ziek</li> <li>- rode uitslag begint in het gezicht en breidt zich snel uit over de rest van het lichaam</li> <li>- opgezette klieren in de nek</li> </ul>	12 tot 23 dagen	Ja, vanaf 10 dagen vóór tot en met 7 dagen na het verschijnen van de roodheid.	Nee	Zwangere vrouwen (eerste 20 weken van de zwangerschap).

Roodvonk	<ul style="list-style-type: none"> <li>-vrij plotselinge hoge koorts</li> <li>- keelpijn, ontstoken amandelen</li> <li>- hoofdpijn, braken</li> <li>- kleine dieprode vlekjes begint in de liezen, zich verspreidend over het hele lichaam, behalve rond neus en mond (narcosekapje). De tong is eerst geheel beslagen, later geheel rood met puntjes (frambozentong)</li> <li>-na een paar dagen verbleekt de huiduitslag en gaat de huid vervellen</li> </ul>	2 tot 7 dagen	Ja, tot het kind zich niet meer ziek voelt. Na aanvang van behandeling met antibiotica is het kind na 48 uur niet meer besmettelijk. Voor ontstaan van de verschijnselen ook via handen of kleding en voorwerpen van contactpersoon.	Nee	Kinderen beneden 3 jaar na een virale luchtweg-infectie.
Vijfde ziekte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lichte koorts</li> <li>- uitslag beginnend in het gezicht (vuurrode appelwangen), zich verspreidend over het hele lichaam.</li> <li>- pijnlijke gewrichten bij volwassenen</li> </ul>	Ongeveer 1 tot 3 weken.	Ja, 1 week voordat de ziekteverschijnselen (koorts, uitslag) uitbreken. Niet besmettelijk meer als de uitslag verschijnt.	Nee	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwangere vrouwen (eerste 20 weken van de zwangerschap).</li> <li>- Kinderen met bloedziekten.</li> </ul>

Waterpokken	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lichte koorts</li> <li>hoesten, hoofdpijn</li> <li>- rode bultjes</li> <li>- blaasjes die erg kunnen jeuken</li> <li>- blaasjes gaan open of drogen in, er ontstaan korstjes die na enige tijd afvallen</li> </ul>	10 tot 21 dagen.	Ja, 2 dagen voor tot 7 dagen na het opkomen van de blaasjes of tot alle blaasjes zijn ingedroogd	Nee, maar zolang de blaasjes niet ingedroogd zijn mogen de kinderen <u>niet</u> naar school komen vanwege de hygiëne en besmettelijkheid gevaar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pasgeborenen als de moeder waterpokken heeft.</li> <li>- Mensen met gestoorde afweer</li> <li>- Zwangere vrouwen die nooit de infectie doormaakten</li> </ul>
Zesde ziekte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- enkele dagen hoge koorts</li> <li>- na het zakken van de koorts; kleine rode vlekjes op de romp, meestal niet op armen, benen en gezicht</li> <li>- komt vooral voor bij kinderen van een ½ jaar tot 3 jaar</li> </ul>	5 Tot 15 dagen, vaak ongeveer 10 dagen.	Ja, vanaf het moment dat de koorts opkomt, totdat de vlekken zijn verdwenen	Nee	Geen

\* De PWA school baseert de wering voornamelijk op hygiëne en besmettingsgevaar voor andere kinderen binnen de groep en school.